

Isolation and Characterization of Lactic Acid Bacteria from Tarkhineh as a Traditional Product with Medicinal Properties against Pathogenic Microorganisms

Tabatabaie Yazdi F¹, Alizadeh Behbahani B^{2*}, Ghaitaranpour A³, Mortazavi A³

¹Associate Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

²Ph.D Student of Food Science and Technology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

³Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

Abstract

Background: Tarkhineh is a traditional fermented food of the western part of Iran (Kermanshah, Ilam, Kurdistan, and Lorestan). Wet Tarkhineh has antibacterial effects. In Kurdish regions, Tarkhineh is used as a traditional medicine for treatment of patients with symptoms of upper respiratory tract infections. The present study aimed to identify the flora of traditional and industrial Tarkhineh to determine its capacity as a traditional healthy food with probiotic potential.

Methods: In this research, dried, wet, and industrial samples were examined regarding total microbial flora, pH, and moisture content. Then, various species of Lactic Acid Bacteria (LAB) were isolated in order to determine their biochemical and morphological features.

Results: According to the results, wet Tarkhineh had the maximum amount of LAB, including *L.nagelii* (67%), *L.bifementans* (21.3%), *Leu.cermoris* (6%), *L.fructosus* (1.45%), *L.fermentum* (1%), *L.intestinalis* (0.9%), *L.agilis* (0.9%), and *L.acidipiscis*(0.9%). In addition, approximately 1% of the isolated samples remained unknown. Moreover, the industrially dried samples contained *L.plantarum*, while the sun-dried samples showed no LAB.

Conclusions: Considering the high amount of LAB in wet Tarkhineh, the authorities are recommended to improve its production process. Overall, this food can be used as a beneficial dietary supplement.

Keywords: Microorganism, Isolation, Identification, Lactic Acid Bacteria

Sadra Med Sci J 2014; 2(3): 245-256

Received: Jan. 16th, 2014

Accepted: June 10th, 2014

* Corresponding Author: **Alizadeh Behbahani, B.** Ph.D Student of Food Science and Technology, Ferdowsi University of Mashhad, behrooz66behbahani@gmail.com

مجله علمی علوم پزشکی صدرا

دوره ۲، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۳، صفحات ۲۴۵ تا ۲۵۶
تاریخ پذیرش: ۹۳/۰۳/۲۰ تاریخ دریافت: ۹۲/۱۰/۲۶

مقاله پژوهشی
(Original Article)

جداسازی و شناسایی لاکتیک اسید باکتری‌های ترخینه به عنوان فراورده‌ای سنتی با خاصیت دارویی علیه میکرووارگانیسم‌های بیماری‌زا

فریده طباطبایی یزدی^۱، بهروز علیزاده بهبهانی^{۲*}، آرش قیطران پور^۲، سید علی مرتضوی^۳

^۱دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

^۲دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

^۳استاد و عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: ترخینه یک غذای نیمه آماده و از محصولات تخمیری سنتی غرب ایران (کرمانشاه، ایلام، کردستان و لرستان) است. ترخینه‌ی تر دارای اثرات ضد میکروبی نیز می‌باشد و در مناطق کردنشین به عنوان داروی سنتی برای درمان بیماری‌هایی با علایم عفونت‌های مجاری فوقانی دستگاه تنفسی به کار می‌رود. هدف از این پژوهش شناسایی فلور میکروبی ترخینه‌ی سنتی و صنعتی جهت تعیین قابلیت این غذا به عنوان یک فراورده‌ی سنتی سلامتی‌زا با پتانسیل پروبیوتیکی می‌باشد.

مواد و روش: در این پژوهش، نمونه‌های ترخینه خشک، ترخینه تر و ترخینه صنعتی با توجه به روش‌های استاندارد از نظر کل جمعیت میکروبی، pH و میزان رطوبت بررسی شدند و سپس انواع گونه‌های لاکتیک اسید باکتری‌ها براساس خصوصیات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی مورد جداسازی و شناسایی قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که نمونه ترخینه تر دارای بیشترین مقدار لاکتیک اسید باکتری بود که شامل *L.fermentum*(٪۱/۶۷) *L.fructosus*(٪۱/۴۵) *Leu.cermoris*(٪۰/۶) *L.bifementans*(٪۰/۲۱/۳) *L.nagelii*(٪۰/۰/۶۷) *L.acidipiscis*(٪۰/۰/۴۵) و *L.agilis*(٪۰/۰/۹) *L.intestinalis*(٪۰/۰/۹) می‌شد و ۱٪ از ایزوله‌ها نیز ناشناخته باقی ماند. نمونه‌هایی که به روش صنعتی خشک شده بودند حاوی لاکتیک اسید باکتری از جنس و گونه‌ی *L.plantarum* بود، اما نمونه ترخینه‌ای که به روش سنتی خشک شده است، فاقد لاکتیک اسید باکتری بود.

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به محتوای بالای لاکتیک اسید باکتری‌ها در محصول سنتی ترخینه‌ی تر، تولید صنعتی و بهینه سازی روند تولید آن پیشنهاد می‌گردد و می‌توان مصرف این ماده‌ی غذایی را به عنوان یک مکمل غذایی فراسودمند توصیه کرد.

واژگان کلیدی: میکرووارگانیسم، جداسازی، شناسایی، لاکتیک اسید باکتری

*نویسنده مسئول: بهروز علیزاده بهبهانی، دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، behrooz66behbahani@gmail.com

می گردد (۵,۶,۷). مواد تشکیل دهنده ترخینه شامل دوغ، بلغور گندم، شلغم، خمیرترش، نمک، سبزیجات معطر، گوجه فرنگی، به و انواع فلفل می باشد.


تولید سنتی ترخینه، نگهداری و مصرف آن

تهیهی دوغ مخصوص: دوغ آن را در بهار تهیه می کنند سپس دوغ در مشک می ریزند تا آب آن گرفته شود و با گیاهان معطر مثل شوید، پونه و نعناء آن را خوش طعم می کنند.

آماده کردن شلغم و گندم: گندم را تمیز کرده پس از شستشو پختن آنرا خشک کرده و آسیاب می کنند و به صورت بلغور گندم در می آورند. بعد آن را با دوغی که از قبل آماده شده و با آب رقیق گشته به همراه شلغم رنده شده و مقداری خمیر ترش محلوت می کنند.

تخمیر: به مدت حداقل ۳ روز و حداقل ۶ روز طول می کشد تا بافت آن نرم گردد.

خشک کردن: ترخینه تولید شده را به صورت دایره های گرد و نازک در آورده آنرا در آفتاب و خشک می کنند. مراحل تولید ترخینه خشک در نمودار (۱) مشخص شده است.



نمودار ۱. مراحل تولید ترخینه خشک

مقدمه

پروبیوتیک ها، میکروارگانیسم های زنده ای هستند که در صورت مصرف در مقادیر کافی دارای اثرات مفید بر سلامتی میزبان می باشند غذاهای پروبیوتیک به عنوان محصولی عمل آوری شده که حاوی میکروارگانیسم های پروبیوتیک زنده در مقادیر کافی باشند معرفی می شوند لاكتوباسیل ها و بیفیدوباکترها معمول ترین پروبیوتیک هایی هستند که در فراورده های لبنی مورد استفاده قرار می گیرند (۱). لاكتوباسیلوس ها در صنعت برای اصلاح بو، طعم و بافت محصولات تخمیری به کار می روند. از جمله مزایای بالقوه غذاهای پروبیوتیک در سلامتی انسان می توان به مواردی همچون بهبود تعادل میکروفلوری دستگاه گوارش، تحریک سیستم ایمنی و فعالیت ضد سلطانی، درمان عدم تحمل لاكتوز، درمان سندروم روده تحریک پذیر، پیشگیری و درمان اسهال و کاهش کلسترول اشاره نمود (۲).

ترخینه یک غذای نیمه آماده است که به عنوان ماده اولیه در تهیه سوپ سنتی در نواحی کوهستانی غرب ایران به کار می رود و یکی از محصولات سنتی تخمیری کشور ایران می باشد (۳). در تاریخ ایران در حدود هزار سال پیش برای اولین بار از ترخینه توسط زمخری در لغت نامه اش نام برده می شود و پس از آن در اواخر قرن دهم هجری شمسی در فرهنگ جهانگیری با نام ترخینه شناخته می شود و سپس در فرهنگ آندراج (۱۲۶۷ ه.ش) نیز ذکر می گردد (۵). ترخینه تر دارای اثرات ضد میکروبی علیه باکتری های بیماریزا نیز می باشد و در مناطق کردنشین به عنوان داروی سنتی برای درمان بیماری هایی با علایم عفونت های مجاری فوقانی دستگاه تنفسی به کار می رود (۱۹). ترخینه در ایران غالبا در استان های کرمانشاه، ایلام، کردستان و لرستان به صورت سنتی تهیه می شود اما در کشورهایی مثل عراق (kishk)، ترکیه (Tarhana)، مصر (kushuk) و چند کشور دیگر نیز فراورده هایی شبیه ترخینه تولید

فراورده‌ی سنتی سلامتی‌زا با خاصیت پروبیوتیکی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

مواد و روش

نمونه ترخینه سنتی خشک و تراز شهرستان کرمانشاه تهیه شد و به همراه نمونه صنعتی جهت بررسی و آنالیز میکروبی و شیمیایی به آزمایشگاه منتقل شد.

محیط کشت‌های de Plate count agar (PCA) و ماد Man, Rogosa and Sharpe (MRS) و ماد Sabouraud Dextrose Agar (SDA) مربوط به آزمون‌های شیمیایی از شرکت مرک آلمان خریداری شد. از محیط کشت PCA جهت بررسی کل جمعیت میکروبی، از محیط کشت MRS برای باکتری‌های اسید لاكتیک و از محیط کشت SDA برای تشخیص رشد کپک و مخمر استفاده شد. سایر دستگاه‌های مورد نیاز این تحقیق عبارت بودند از انکوباتور، بن ماری و اتوکلاو مدل (Memmert)، pH متر (Metrohm)، پرگنه شمار مدل (RTCSL902)، میکروسکوپ نوری مدل (OLYMPUS DP12)، جار بی‌هوایی و گازپاک نوع A (مرک آلمان).

آزمایشات میکروبی

به منظور آنالیز میکروبی ۵ گرم از هر نمونه تحت شرایط استریل به ۴۵ میلی لیتر محلول استریل سیترات سدیم ۲٪ (وزنی/حجمی) اضافه شد و به مدت یک دقیقه هموژن گردید، تا رقت ۱/۰ به دست آید. رقت‌های اعشاری در محلول آب پیتونه ۱/۰٪ (وزنی/حجمی) تهیه شد. پس از تهیه رقت‌های مناسب از نمونه ترخینه، بر روی پلیت‌های حاوی محیط کشت MRS، PCA و SDA به روش سطحی کشت داده شد و در دمای ۳۰°C به مدت ۷۲-۴۸ ساعت گرمخانه گذاری و سپس پرگنه‌های تشکیل شده از نظر تعداد، اندازه، شکل ورنگ بررسی شدند (۱۳). کلیه‌ایی که در محیط MRS از لحاظ شکل، اندازه، کدر یا شفاف بودن و سایر

با توجه به شواهد تاریخی شاید بتوان ترخینه را به عنوان اولین غذای نیمه آماده ایران شناخت. خصوصیات کیفی و ارگانولیپتیکی ترخینه نظیر بافت، بو، عطر و طعم به عوامل مختلفی از جمله کیفیت مواد اولیه، کیفیت میکروبی آن و شرایط انجام تخمیر بستگی دارد. مطالعاتی که بر روی غذاهای شبه ترخینه انجام شده است نشان می‌دهد که ترخینه داری ارزش تغذیه‌ای بالای است و می‌توان از آن به عنوان منبع خوبی از پروتئین، ویتامین‌ها و مواد معدنی استفاده کرد زیرا بسیاری از مواد مغذی ترخینه نظیر ویتامین‌ها و اسیدهای آلی در حین تخمیر ترخینه تولید می‌شوند (۹-۱۰). ترخینه به علت دارا بودن رطوبت کم (۶-۹٪) و همچنین pH پایین (۴-۴/۸) محیط نامناسبی جهت رشد میکروارگانیسم‌های بیماریزا و عامل فساد می‌باشد به همین علت می‌توان آن را بدون هیچ مشکلی تا دو سال نگهداری کرد (۱۱، ۱۲). به علت مصرف دوغ در تولید ترخینه، اسید لاكتیک باکتری‌ها که به طور گسترده در طبیعت پراکنده‌اند نقش مهمی در تخمیر آن دارند این گروه از باکتری‌ها شامل ۱۱ جنس می‌باشند که مهمترین جنس‌های مورد استفاده در فرآورده‌های لبنی شامل لاکتوباسیلوس، لاکتوکوکوس، پدیوکوکوس و لوکونستوک می‌باشند که عموماً میکروارگانیسم‌های بی خطر شناخته شده‌اند (۱۳). مطالعات انجام گرفته بر روی غذاهای شبه ترخینه نشان داده است که در این غذاها تنوع زیادی از نظر جنس‌های لاكتیک اسید باکتری‌ها به چشم می‌خورد (۸). با وجود انجام مطالعات نسبتاً خوب در مورد میکروارگانیسم‌های تخمیر کننده‌ی غذاهای شبه ترخینه، تا کنون میکروارگانیسم‌های تخمیر کننده‌ی ترخینه بررسی نشده است. به همین علت در این پژوهش ضمن بررسی میکروارگانیسم‌های تخمیر کننده‌ی ترخینه، فلور میکروبی ترخینه‌ی سنتی و صنعتی جهت تعیین قابلیت این غذا به عنوان یک

بود و همهی این جمعیت مربوط به کپک و مخمر بود به عبارت دیگر نمونهی ترخینهی خشک سنتی فاقد اسیدلاکتیک باکتری بود کل جمعیت میکروبی نمونه ترخینه سنتی تر 3×10^7 cfu/gr بود. که از این میان $1/73 \times 10^7$ cfu/gr به لاکتیک اسید باکتریها و $2/5 \times 10^6$ cfu/gr نیز به کپک و مخمر اختصاص داشت. که میتوان گفت لاکتیک اسید باکتریهای موجود در ترخینه تر باعث کاهش و توقف رشد پاتوژنها شده اند. اما شمارش کلی نمونههایی که به روش صنعتی خشک شده اند $2/46 \times 10^5$ cfu/gr بود که 4×10^4 cfu/gr مربوط به لاکتیک اسید باکتریها از جنس و گونهی *L.plantarum* و $1/38 \times 10^5$ cfu/gr مربوط به کپک و مخمرها بود. در نمونه سنتی تر فقط 10 پرگنه و در نمونه صنعتی فقط 3 پرگنه با اندازه، شکل و یا رنگ متفاوت شناسایی شد و آزمایش‌های قند، کاتالاز، گرم و تولید گاز از گلوکز بر روی آنها انجام گرفت (۱۳) که نتایج آن در جدول(۲) آمده است. تطبیق نتایج آزمایشات بیوشیمیایی، تخمیر قندها و تشخیص جنس و گونهی اسیدلاکتیک باکتریها به کمک جداول ارائه شده در کتاب برگی انجام شد. همچنین طبق عکس‌های میکروسکوپی که از لاکتیک اسید باکتریهای ترخینه گرفته شد، میتوان گفت که ایزوله‌های (۱۰)، (L.fructosus) تشخیص داده شدند. این ایزوله‌ها 1.45% از کل ایزوله‌ها را شامل می‌شوند(شکل شماره(۱)). ایزوله شماره (۲)، (L.fermentum) تشخیص داده شد و 1% از ایزوله‌ها را تشکیل می‌دهد (شکل ۲).

جدول ۱. مقایسه بار میکروبی، رطوبت و pH نمونه‌های سنتی تر، سنتی خشک و صنعتی ترخینه

pH	رطوبت	(CFU /gr) LAB	(CFU /gr) کپک، مخمر	(CFU /gr) شمارش کلی	نوع نمونه
۴/۲	٪۷۳	$1/73 \times 10^7$	$2/67 \times 10^6$	$2/91 \times 10^7$	سنتی تر
۳/۳۲	٪۶/۴	-	4×10^4	4×10^4	سنتی خشک
۴/۰۸	٪۷	4×10^4	$1/38 \times 10^5$	$2/46 \times 10^5$	صنعتی

■ کلیه آزمایشات در ۳ تکرار انجام پذیرفت ($P \leq 0/05$).

ویژگی‌های ظاهری متفاوت بودند به صورت جداگانه روی پلیت‌های حاوی محیط قبلی یک بار دیگر کشت داده شدند تا عمل خالص سازی و جداسازی صورت گیرد(۱۳). از کلنی‌های تشکیل شده لام تهیه شد و رنگ آمیزی گرم و آزمایش کاتالاز انجام گرفت. برای شناسایی گونه لاکتیک اسید باکتری‌ها، رنگ آمیزی گرم، واکنش کاتالاز، تولید گاز از گلوکز و آزمایش تخمیر قندها انجام شد. قندهای مورد استفاده شامل گلوکر، مالتوز، مانیتول، گالاکتور، فروکتوز، ساکارز، سوربیتول، لاکتوز، ملیبیوز، گلوکونات و رافینوز بود. برای انجام آزمایش قندها، از دو درصد قند در محیط فنل رد براث استفاده شد (۱۳، ۱۴). تمامی آزمایشات در ۳ تکرار انجام پذیرفت.


اندازه‌گیری pH

جهت اندازه‌گیری pH نمونه‌های ترخینه، ابتدا دستگاه pH متر توسط بافرهای ۷ و ۴ تنظیم شد و سپس ۵۰ تا ۷۵ گرم از نمونه در بشر ریخته شد و توسط دستگاه، pH آن اندازه‌گیری شد [استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۶]. اسیدیته نیز به وسیله تیتراسیون با سود ۱۰ نرمال و معرف فنول فتالین تعیین گردید. تمامی آزمایشات در ۳ تکرار انجام پذیرفت.




یافته‌ها

آزمایش‌های میکروبی و فیزیکوشیمیایی بر روی نمونه‌های سنتی و صنعتی ترخینه انجام شد که نتایج حاصل آن در جدول شماره(۱) و نمودار شماره(۱) مشخص گردیده است. طبق نتایج به دست آمده کل بار میکروبی نمونه ترخینه خشک سنتی 4×10^4 cfu/gr می‌باشد.


ایزوله شماره (۷)، (*L.acidipiscis*) تشخیص داده شد و ۴۵٪ از ایزوله‌ها را تشکیل می‌دهد (شکل ۷). ایزوله شماره (۹)، (*L.nagelii*) تشخیص داده شد و ۶۷٪ از ایزوله‌ها را تشکیل می‌دهد (شکل ۸). ایزوله شماره (۱۰)، (*L.bifementans*) تشخیص داده شد و ۲۱.۳٪ از ایزوله‌ها را تشکیل می‌دهد (شکل ۹). ایزوله‌های ۱۱، ۱۲ و ۱۳، (*L.plantarum*) تشخیص داده شدند (شکل ۱۰).

شکل ۲: (*L.fermentum*)

ایزوله شماره (۳)، با داده‌های موجود در کتاب برگی مطابقت نداشت که شامل ۱٪ از ایزوله‌ها می‌شود (شکل ۳). ایزوله شماره (۴)، (*Leu.cermoris*)، ایزوله شد و شامل ۶٪ از ایزوله‌ها می‌شود (شکل ۴). ایزوله شماره (۵)، (*L.intestinalis*)، تشخیص داده شد و ۰.۹٪ از ایزوله‌ها را تشکیل می‌دهد (شکل ۵). ایزوله شماره (۶)، (*L.agilis*)، تشخیص داده شد و ۰.۹٪ از ایزوله‌ها را تشکیل می‌دهد (شکل ۶).

شکل ۱: (*L.fructosus*)شکل ۴: (*Leu.cermoris*)

شکل ۳

شکل ۶: (*L.agilis*)شکل ۵: (*L.intestinalis*)

شکل ۸: *(L.nagelii)*

A light micrograph showing branched, filamentous bacteria stained blue. A scale bar in the top right corner indicates 200 μm.

شکل ۷: *(L.acidipiscis)*

A light micrograph showing numerous rod-shaped bacteria stained blue. A scale bar in the top right corner indicates 200 μm.

شکل ۱۰: *(L.plantarum)*

A light micrograph showing rod-shaped bacteria stained blue. A scale bar in the top right corner indicates 200 μm.

شکل ۹: *(L.bif fermentans)*

A bar chart illustrating the distribution of various Lactobacillus species. The Y-axis represents the count of species, ranging from 0 to 70. The X-axis lists the species names. The bars show that *L. nagelli* is the most abundant species, followed by *L. bif fermentance*, while others are present in much smaller quantities.

Species	Count
<i>L. nagelli</i>	~70
<i>L. bif fermentance</i>	~25
<i>Leu. cermoris</i>	~8
<i>L. fructosus</i>	~3
<i>L. fermentum</i>	~2
<i>L. intestinalis</i>	~2
<i>L. agilis</i>	~2
<i>L. acidipiscis</i>	~2

نمودار ۲. توزیع جنس لاکتیک اسید باکتری های موجود در ترخینه

www.sadramj.com

جدول ۲. نتایج تخمیر قند، تولید گاز از گلوکز، آزمایش کاتالاز و گرم

گرم	کاتالاز	گلوکز	تولید گاز از گلوکز	رافینوز	گلوکونات	ملیبیوز	لاکتوز	سوربیتول	ساکارز	فروکتوز	گالاکتوز	مانیتول	مالتوز	گلوکز	کد	
+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	۱	نحوه سنتی
+	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	۲	
+	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	d	-	+	۳	
+	-	-	-۲	-۲	-	+۱	-۲	+۱	-	-	d	-	d	+	۴	
+	-	-	+	-۲	-۱	-۲	-	+	-۲	+۲	+۲	+	-۲	+	۵	
+	-	-	+	-	-۱	+	-	+	-۱	+۱	+	+	+	+	۶	
+	-	-	-	-	-	-۲	-	+	+۲	+۲	+	+	-۲	-۱	۷	
+	-	-	-	-	-	-	-	-	-۱	-	-	-	-	+	۸	
+	-	-	-	-۲	-	-	-۲	-	+	+۲	+۲	+	+۲	+	۹	
+	-	-	+۱	-	-	-	-	-	-	-۱	-	+	+	+۱	۱۰	
+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	۱۱	نحوه خشک
+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	۱۲	
+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	۱۳	
فاقد لاکتیک اسید باکتری																

۱- با نتایج گزارش شده در کتاب برگیس تطابق نداشت.

۲- این قند در کتاب برگیس مورد آزمایش قرار نگرفته بود. d - واکنش با تاخیر انجام شد.

(۱۶). در پژوهشی دیگر مشخص شد که کپکها بیشترین سهم را در بار میکروبی نان دارند و با گذشت زمان این سهم افزایش می‌یابد (۱۷). بررسی‌های گذشته نیز نیز در تایید نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ترخینه منبع غنی از باکتری‌های اسید لاکتیک مفید می‌باشد. که برخی از آنها پروبیوتیک اند و دارای قابلیت تکثیر در روده و کاهش سطح کلسترول هستند (۳). همان طور که در شکل (۲) آورده شده است لاکتوپاسیلوس‌ها بیشترین درصد

بحث
روطوبت ترخینه خشک سنتی ۶/۴٪ است. این نتایج با گزارشات داده شده در مورد بار میکروبی آرد، نان و غذاهای شبیه به ترخینه همخوانی دارد. کپک و مخمر در آرد با رطوبت ۱۴٪ بیشترین بخش فلور میکروبی را به خود اختصاص داده است (۱۵)، همچنین گزارش شده است که در غذاهای شبیه به ترخینه کاهش رطوبت به حدود ۳-۹٪ در pH ۴/۵ تا ۴ باعث توقف رشد باکتری‌ها، مخصوصاً باکتری‌های بیماریزا می‌شود

نمودند (۲۲). در پژوهشی دیگر طباطبایی بزدی و همکاران (۲۰۱۳) اثر دما را بر روی تغییرات میکروارگانیسم های عامل تخمیر در غذای تخمیری کیمچی مورد بررسی قرار داند نتایج این محققان نشان داد که رشد میکروارگانیسم ها کاملاً وابسته به دمای تخمیر می باشد و با افزایش دما تا ۳۷ درجه سانتی گراد رشد میکروارگانیسم ها افزایش پیدا کرد (۲۳). قیطران پور و همکاران (۲۰۱۳) تاثیر فاکتورهای مدت زمان پخت گندم (۰، ۱ و ۳/۵ ساعت)، دمای خشک- کردن (۷۰، ۸۰، و $^{\circ}\text{C}$ ۹۰)، زمان خشک کردن (۳۰ تا ۹۰۰ دقیقه) و دانه بندی (ریز، متوسط، درشت) بر روند خشک شدن ترخینه، در خشک کن هوای داغ را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهشگران نشان داد که رفتار خشک شدن ترخینه کاملاً تحت تاثیر متغیرهای ذکر شده قرار داشت. جهت افزایش سرعت تولید و بهبود رنگ ترخینه، یک ساعت پخت گندم و خشک کردن در دمای ۸۰ درجه ساتیگراد پیشنهاد می شود (۲۴). با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر مبنی بر عدم باکتری های لاکتیک اسید باکتری های در ترخینه خشک شده به روش سنتی اصلاح روش خشک کردن پیشنهاد می شود. همچنین با توجه به میزان بالا بودن لاکتیک اسید باکتری های موجود در ترخینه تر پیشنهاد می شود که این غذای تخمیری به صورت تازه مصرف شود.

نتیجه گیری

امروزه غذاهای پروبیوتیک به عنوان فراورده های عمل آوری شده حاوی باکتری های پروبیوتیک زنده در مقادیر کافی، جهت اثرات مفید بر سلامتی انسان معرفی می شوند. با توجه به محتوای بالای لاکتیک اسید باکتری ها در محصول سنتی ترخینه تر، تولید صنعتی و بهینه سازی روند تولید آن پیشنهاد می گردد و می توان مصرف این ماده ای غذایی را به عنوان یک

فراوانی را در بین جنس های شناسایی شده به خود اختصاص داده بودند. حضور بیشتر لاکتوباسیلوس ها نیز در فراورده های مختلف تخمیری گزارش شده است (۱۸، ۸). ترخینه حاوی باکتری های لوکونستوک مزنتروئیدس، لاکتوباسیلوس پلانتاروم ولاکتوباسیلوس فرمنتوم می باشد که این باکتری های پروبیوتیک همانند لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در محصولات لبنی فعالیت ضد جهش زایی زیادی از خود نشان می دهند که به میزان قابل توجهی β گلوكوسیداز و β گلوكورونیداز را کاهش می دهد. این آنزیم های سمی در کلون انسان مواد پیش سرطان زا را به مواد سرطان زا تبدیل می کنند و pH را کاهش می دهند (۲۰). طباطبایی بزدی و همکاران (۲۰۱۳) اثر دما و غلظت نمک را بر روی رشد میکروارگانیسم های موجود در ترخینه مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهشگران نشان داد که رشد میکروارگانیسم ها کاملاً وابسته به دمای تخمیر می باشد و با افزایش دما تا ۳۷ درجه سانتی گراد رشد میکروارگانیسم ها افزایش پیدا کرد این میزان افزایش میکروارگانیسم ها تا روز دوم عمل تخمیر ادامه پیدا کرد، سپس با توجه با رقابت میان میکروارگانیسم ها از روز روز دوم به بعد تعداد میکروارگانیسم ها کاهش پیدا کرد (۲۱). طباطبایی بزدی و همکاران (۲۰۱۳) جداسازی و شناسایی لاکتیک اسید باکتری های موجود در غذای تخمیری کیمچی را با استفاده از روش های مبتنی بر کشت و به منظور معرفی محصول به عنوان یک ماده غذایی پروبیوتیک و مقایسه آن با کیمچی تخمیری کشور کره جنوبی مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که لاکتیک اسیدهای شناسایی شده در کیمچی ایران با لاکتیک اسید باکتری های موجود در کیمچی کشوره کره جنوبی از نظر جنس و گونه با هم متفاوت هستند. این محققان علت این پدیده را تفاوت در مواد اولیه و سبزیجات مورد استفاده در کیمچی تهیه شده در ایران ذکر

مکمل غذایی فراسودمند با پتانسیل پروریوتیکی توصیه کرد (جدول شماره ۱).

تقدیر و تشکر

بدین وسیله از مهندس منصوری نژاد و خانم میرانی که در تهیه نمونه‌ها ما را یاری نمودند، همچنین از مهندس قروینی و خانم مهندس افشاریان به خاطر کمک در انجام آزمایشات قدردانی می‌شود. مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با کد ۲۰۲۵۴ در دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد، لذا نویسنده‌گان بر خود لازم می‌دانند که از مساعدت‌های معاون پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد صمیمانه تشکر و قدرانی نمایند.

منابع

- cereal food. *Food Chemistry*. 2005; 90(1): 127-32.
7. Bahnasawy A, Shenana M. A mathematical model of direct sun and solar drying of some fermented dairy products (Kishk). *Journal of Food Engineering*. 2004; 61(3): 309-19.
8. Sengun IY, Nielsen DS, Karapinar M, Jakobsen M. Identification of lactic acid bacteria isolated from Tarhana, a traditional Turkish fermented food. *International Journal of Food Microbiology*. 2009; 135(2):105-1.
9. Turantaş F, Kemahlioğlu K. Fate of some pathogenic bacteria and molds in Turkish Tarhana during fermentation and storage period. *Journal of Food Science and Technology*. 2012; 1(1): 1-7.
10. Ibanoglu S, Ainsworth P. Application of response surface methodology for studying the viscosity changes during canning of tarhana, a cereal-based food. *Journal of Food Engineering*. 2004; 64(3): 273-5.
11. Yilmaz MT, Sert D, Demir MK. Rheological properties of Tarhana soup enriched with whey concentrate as a function of concentration and temperature. *Journal of Texture Studies*. 2010; 41(6): 863-79.
12. Ibanoglu S, Ainsworth P, Wilson G, Hayes GD. The effect of fermentation conditions on the nutrients and acceptability of tarhana. *Food chemistry*. 1995; 53(2): 143-7.
13. Ahmadi M, Khomairy M, Khosroshahi A, Kashani-Nejad M. [Isolation and characterization of lactic acid bacterial flora Lighvan traditional cheese]. *Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources*, 2009; 16(3):12-8 (Persian).
14. Mortazavi A, Zyrjany L, Tabatabai Yazdi F. [Food microbiology and laboratory applications. Printing (Persian)]. Institute of Ferdowsi University Press, 2009; 155-153.

21. Tabatabaei Yazdi F, Alizadeh Behbahani B, Mortazavi A. Effect of temperature and salt concentration on microbial changes during Tarkhineh fermentation. *Scientific Journal of Biological Sciences*. 2013; 2(1); 8-16.
22. Tabatabaei Yazdi F, Alizadeh Behbahani B, Mohebbi M, Mortazavi A, Ghaitaranpour A. Isolation, identification and comparison of lactic acid bacteria from fermented be produced in Iran Kimchi with Korean commercial samples: introduction of a probiotic product. *Scientific Journal of Biological Sciences*. 2013; 1(6); 20-5.
23. Tabatabaei Yazdi F, Alizadeh Behbahani B, Mohebbi M, Mortazavi A, Ghaitaranpour A. Effect of temperature on microbial changes during kimchi fermentation. *Scientific Journal of Microbiology*. 2013; 2(1); 9-14.
24. Ghaitaranpour A, Tabatabaei Yazdi F, Alizadeh Behbahani B, Mohebbi M, Mortazavi A. The effect of wheat boiling time, bulgur particle size, drying time and temperature on some physical properties of hot air dried Tarkhineh. *Scientific Journal of Pure and Applied Science*. 2013; 2(4): 175-182.
15. Aydin A, Paulsen P, Smulders FJM. The physico-chemical and microbiological properties of wheat flour in Thrace. *Turkish Journal of Agricultural and Forestry*. 2009; 33(1): 445-454.
16. Sengun IY, Karapinar M. Microbiological quality of Tarhana, Turkish cereal based fermented food. *Quality Assurance and Safety of Crops & Foods*. 2011; 1(1): 34-9.
17. Ogundare A, Adetuyi F. Studies on the microbial population of bread baked with wheat flour from south western Nigeria. *Journal of Food Agriculture and Environment*. 2003; 1(1):85-7.
18. Erbaş M, Certel M, Kemal Uslu M. Microbiological and chemical properties of Tarhana during fermentation and storage as wet—sensorial properties of Tarhana soup. *LWT-Food Science and Technology*. 2005; 38(4): 409-16.
19. Dabbagh A. Antimicrobial effects of Tarkhineh. Generic pharmacy doctoral thesis, Shiraz University of Medical Sciences, School of Pharmacy. 2000; 2(1): 75-8. (Persian)
20. Hui YH, Meunier-Goddik L, Hansen AS, Josephsen J, Nip WK, Stanfield PS, et al. *Handbook of food and beverage fermentation technology*: CRC; 2004.

Cite this article as:

Tabatabaei Yazdi F, Alizadeh Behbahani B, Ghaitaranpour A, Mortazavi A. Isolation and characterization of lactic acid bacteria from Tarkhineh as a traditional product with medicinal properties against pathogenic microorganisms. *Sadra Med Sci J* 2014; 2(3): 245-256

